



INFORMACIÓN TÉCNICA

Distofin[®]15%



SUSPENSIÓN ORAL

Para el tratamiento y control de Fasciola hepática en todos sus estadios, inmaduros y adultos.

Distofin15%[®] es un exterminador de Fasciola hepática en sus estadios inmaduros y adultos, causantes de distomatosis aguda, subaguda y crónica en bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y equinos; posee un efecto residual que después de ser aplicado no existen huevos de Fasciola en heces hasta por 11 semanas.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL contiene:

Triclabendazole..... 15 g.

Excipientes c.s.p..... 100 mL.

MECANISMOS DE ACCIÓN:

Triclabendazole

Los bencimidazoles se conjugan con una tubulina, proteína estructural y bloquean la polimerización de tubulina en los microtúbulos. De esta manera se bloquea la integridad y funciones de transporte de las células absorbentes dentro del parásito. La conjugación con la tubulina es reversible y saturable.

ESPECIES INDICADAS:

Bovinos, equinos, ovinos, camélidos sudamericanos, y caprinos.

INDICACIONES:

Agentes etiológicos susceptibles:

Triclabendazole:

Acción sobre *Fasciola hepática* (Formas adultas y jóvenes inmaduras) desde las 2 semanas siguientes a la infestación.





INFORMACIÓN TÉCNICA

Distofin[®] 15%



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Especie	Dosis
Vacunos	2 mL/ 25 Kg peso vivo
Ovinos	1 mL/ 15 Kg peso vivo
Caprinos	1 mL/ 15 Kg peso vivo
Equinos	2 mL/ 25 Kg peso vivo
Camélidos sudamericanos	1 mL/ 15 Kg peso vivo

- Vía Oral.

RESTRICCIONES DE USO:

-Tiempo de retiro para carne: 28 días posteriores al último tratamiento,

-No administrar en animales productores de leche para el consumo humano.

PRECAUCIONES y RECOMENDACIONES:

-Puede ser administrado en animales de cualquier edad y en cualquier momento de la preñez no es embriotoxico ni teratogénico.

-Venta bajo prescripción del Médico Veterinario.

-Conservar en un lugar fresco y seco, almacenar entre 15°C a 30°C.

- Protegerse de la luz solar.

-No beber, fumar o comer durante el tratamiento.

-Lavarse las manos después del tratamiento.

-Enterrar o incinerar los envases vacíos.





INFORMACIÓN TÉCNICA

Distofin[®] 15%



INOCUIDAD:

En dosis recomendadas no tiene ninguna contraindicación aún en animales debilitados o altamente parasitados.

COMPATIBILIDAD:

Distofin 15%[®] puede ser aplicada simultáneamente con vitaminas y minerales.

PRESENTACIONES:

Distofin15%[®] se encuentra disponible en las siguientes presentaciones:

Frascos 250, 500, 1000 mL.

Sachets x 30 mL.

REG. SENASA: F.08.02.N.0864

Manténgase fuera del alcance de los niños.



CENTRO DE LLAMADO
REYTA S.A.C.

(051) (01) 440 – 0917

Jr. Tupac Amaru N° 1590
La perla - Callao
LIMA - PERÚ

Oficina: Jr. Tupac Amaru N° 1590
La perla- Callao – Lima – Perú
E-mail: ventas@reytaperu.com
www.reytaperu.com
Teléfono: (051) (01) 4400917



“Comprometidos con
la
salud y la vida”