



INFORMACIÓN TÉCNICA



Antiparasitario externo para uso veterinario Ectoparasiticida para el tratamiento y prevención de parásitos externos en perros y gatos.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL contiene:

Fipronil.....0.25 g.

Excipientes c.s.p..... 100 mL.

MECANISMOS DE ACCIÓN:

El Fipronil Actúa como antagonista del GABA fijándose al receptor en el interior del canal ionóforo de cloro. Normalmente, el flujo de cloro está regulado por el receptor de GABA que permite la apertura del canal, provocando la hiperpolarización de la célula nerviosa con la consecuente disminución de su actividad. El bloqueo del ionóforo de cloro anula el efecto neuromodulador del GABA, inhibiendo el flujo intracelular de aquel ion, lo que conduce a la muerte de parásito por hiperexcitación.

ESPECIES INDICADAS:

Perros y gatos.

INDICACIONES:

En caninos y felinos para el tratamiento y control de infestaciones por pulgas (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis) eliminando todos sus estadios (huevo, larva y adulto), garrapatas (Rhipicephalus sanguineus) y piojos (Trichodectes spp.). Posee efecto adulticida y acción reguladora del crecimiento de los artrópodos, acabando con larvas y huevos, previniendo reinfestaciones en perros y gatos desde el entorno ambiental. Se recomienda su uso como tratamiento complementario de Dermatitis Alérgica por Pulgas (DAPP).

ADMINISTRACIÓN:

- Vía tópica.

- La aplicación se realiza sobre toda la superficie del corporal a 15 cm del animal, a contrapelo y cubriendo la totalidad del animal uniformemente.

DOSIS:

Oficina: Jr. Tupac Amaru N° 1590
La perla – Callao - Lima – Perú
E-mail: ventas@reytaperu.com
www.reytaperu.com
Teléfono: (051) (01) 4400917



*“Comprometidos con
la
salud y la vida”*



INFORMACIÓN TÉCNICA



Caninos y felinos: 7.5 - 15 mg de fipronil /Kg de peso vivo.

De acuerdo al pelo del animal, aplicándose 3 mL del producto para animales de pelo corto y 6 mL para animales de pelo largo.

REACCIONES ADVERSAS:

-En las dosis recomendadas no existen reacciones adversas aun en hembras gestantes.

PRECAUCIONES:

-No bañar a los animales dentro de las 48 horas anteriores o posteriores de la aplicación del producto.

-No beber, fumar o comer durante el tratamiento.

-Aplicar el producto al animal en un espacio ventilado.

-Durante la aplicación mantener el frasco en posición vertical para tener una buena presión de pulverizado, dirigiendo a la espalda, cuello, pecho, abdomen, patas. Para el tratamiento de la cara vierta el producto en la palma de su mano enguantada, luego aplíquelo sobre la cara, en forma suave evitando los ojos y boca.

-Tener precaución en animales debilitados o viejos.

-Producto moderadamente tóxico.

-Utilizar guantes durante la aplicación.

-Evitar el contacto del producto con los ojos de las personas.

-Lavarse las manos después del tratamiento.

-Enterrar o incinerar los envases vacíos.

-El fipronil puede afectar a peces y organismos acuáticos. No contaminar cursos de agua como ríos, arroyos, etc.

RECOMENDACIONES:

-Venta bajo prescripción del Médico Veterinario.

-Conservar en un lugar fresco y protegerse de la luz solar.

-Almacenar entre 15°C a 30°C.





INFORMACIÓN TÉCNICA



-Agitar antes de usar.

TOXICIDAD:

Producto Moderadamente Tóxico.

-Por contacto con ojos y/o piel: lave los ojos con abundante agua, en la piel lave la zona con abundante agua y jabón.

-Por ingestión: Beba agua e induzca al vómito si la persona permanece consciente.

-Acudir al médico inmediatamente y/o servicio de emergencia y presentar esta etiqueta.

PRESENTACIONES:

Bye fleas® se encuentra disponible en las siguientes presentaciones:

Frascos atomizadores x 60 y 120 mL.

Frasco con pistola atomizadora x 250 mL.

REG. SENASA: F.87.58.N.00114.

Manténgase fuera del alcance de los niños.



CENTRO DE LLAMADO
REYTA S.A.C.

(051) (01) 440 – 0917

Jr. Tupac Amaru N° 1590
La perla - Callao
LIMA - PERÚ

Oficina: Jr. Tupac Amaru N° 1590
La perla – Callao - Lima – Perú
E-mail: ventas@reytaperu.com
www.reytaperu.com
Teléfono: (051) (01) 4400917



“Comprometidos con
la
salud y la vida”