



INFORMACIÓN TÉCNICA

Dectofin-F[®]

Ivermectina 1% + Clorsulón 10%



Solución inyectable para uso veterinario

Endectocida de amplio espectro para Bovinos y ovinos

COMPOSICIÓN:

Cada 1 ml contiene:

Clorsulon.....	100 mg
Ivermectina.....	10 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

INDICACIONES:

Es altamente efectivo para el tratamiento y control de nemátodos gastrointestinales (incluyendo las formas inhibidas de *Ostertagia ostertagi*); parásito pulmonar (*Dictycaulus viviparus*); parasito ocular (*Thelazia* spp. adulto), trematodos hepáticos (*Fasciola hepática*) y parásitos externos: nuca (*Dematobia hominis*); gusaneras (*Cochliomyia hominivorax* y *Chysomya bezziana*); piojos (*Linognathus vituli*, *Haematopinus eursterneus*, *Solenopotes capillatus*); ácaros de la sarna (*Psoroptes bovis*, *Sarcopotes scabiei* var. *bovis*, *Chorioptes bovis*), y de la garrapata del género *Boophilus microplus*.

DOSIFICACION:

Vía subcutánea.

Bovinos: 1 ml de producto por cada 50 Kg de peso vivo (Equivale a 10mg de Ivermectina y 100 mg de Clorsulon); o administrar 0.02 ml de producto por cada kg de peso vivo (Equivale a 200 ug de Ivermectina y 2 mg de Clorsulón). Dosis única.

PERIODO DE RETIRO:

BOVINOS:

Carne: 66 días

Leche: No utilizar en animales productores de leche para el consumo humano. No utilizar en vacas lecheras que no están en lactación incluyendo las vacas gestantes en los 60 días anteriores al parto.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO:

- No administrar vía intravenosa o intramuscular.
- No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida a las sustancias activas.
- No administrar en animales productores de leche para consumo humano.
- No utilizar en vacas lecheras que no están en lactación incluyendo vacas gestantes en los 60 días antes del parto.





INFORMACIÓN TÉCNICA

Dectofin-F[®]

Ivermectina 1% + Clorsulón 10%



PRECAUCIONES DE USO:

ANTES DE SU USO:

Almacenar el producto en los recipientes originales cerrados, en una pieza con buena ventilación. El recipiente no tiene que estar deteriorado, ni roto.
Usarse solo como se indica.

DURANTE SU USO:

Al administrar la solución solo por vía subcutánea

DESPUÉS DE SU USO:

Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar. Eliminar las jeringas descartables usadas.

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO:

Almacenar en lugar fresco entre 15° y 30° C.
Proteger de la humedad y la luz

PRESENTACIONES:

Dectofín F se encuentra disponible en las siguientes presentaciones:

Frascos x 10, 20, 50, 100, 250, 500 mL.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos



CENTRO DE LLAMADO
REYTA S.A.C.

(051) (01) 440 0917

Jr. Tupac Amaru N° 1590- La Perla
Callao- LIMA - PERÚ

Jr. Tupac Amaru N° 1590- La Perla
Callao – Lima – Perú
E-mail: ventas@reytaperu.com
www.reytaperu.com
Teléfono: (051) (01) 4400917



*“Comprometidos con
la
salud y la vida”*