



INFORMACIÓN TÉCNICA

IVERMECTINA L.A. 1.5%
DECTOFIN PROLONG®



Solución inyectable para uso veterinario

Endoectoparasitocida para el control de los parásitos internos y externos de larga acción en bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y porcinos.

DECTOFIN PROLONG® Solución estéril inyectable que contiene ivermectina al 1.5%, contiene un vehículo orgánico el cual facilita la absorción, biodisponibilidad y residualidad del producto además de no producir irritación ni dolor en el punto de aplicación.

COMPOSICIÓN:

Ivermectina.....15 mg

Excipientes c.s.p..... 1 ml

MECANISMOS DE ACCIÓN:

Actúa sobre los parásitos bloqueando la señal de transmisión desde las interneuronas hasta las motoneuronas excitadoras, estimulando los iones cloruro mediada por el GABA provocando la parálisis y muerte del parásito.

ESPECIES INDICADAS:

Bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos, porcinos y caprinos.

INDICACIONES:

Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos:

- Nematodos Gastrointestinales: Haemonchus, Ostertagia, Cooperia, Trichostrongylus, Bunostomum, Oesophagostomum, Nematodirus, Strongyloides, Trichuris, Dyticocaulus viviparus.
- Miasis provocadas por Dermatobia hominis (TUPE) y Cochliomyia hominivorax.
- Piojos chupadores: Linognatus, Haematopinus y Solenoptes.
- Ayuda al Control del piojo masticador Damalinia bovis.
- Ayuda al control de Boophilus microplus.
- Ácaros de la sarna: Psoroptes, Sarcopies, Chorioptes.
- Oestrus ovis.

Oficina: Jr. Tupac Amaru N° 1590- La Perla
Callao – Lima – Perú
E-mail: ventas@reytaperu.com
www.reytaperu.com
Teléfono: (051) (01) 4400917



*“Comprometidos con
la
salud y la vida”*



INFORMACIÓN TÉCNICA

IVERMECTINA L.A. 1.5%
DECTOFIN PROLONG®



Cerdos:

-Nemátodos Gastrointestinales: Hyostrongylus, Ascaris, Strongyloides, Trichuris, Oesophagostomum, Metastrongylus, Stephanurus.

-Ácaros de la sarna: Sarcoptes scabiei.

- Piojos: Haematopinus suis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Cuadro de Dosificación	
Bovinos	1 ml por cada 75 kg de peso vivo equivale a 200 mcg por kilo
Porcinos	1 ml por cada 50 kg de peso vivo equivale a 300 mcg por kilo
Alpacas/Ovinos	1 ml por cada 75 kg de peso vivo equivale a 200 mcg por kilo

- Vía Subcutánea.

RESTRICCIONES DE USO:

-Tiempo de retiro para carne: 42 días posteriores al último tratamiento,

-No administrar en vacas en periodo de lactación.

-No utilizar en animales gestantes dentro de 42 días dentro del parto.

PRECAUCIONES:

-No administrar por vía endovenosa.

-No beber, fumar o comer durante el tratamiento.

-Lavarse las manos después del tratamiento.

-Enterrar o incinerar los envases vacíos.

-La Ivermectina puede afectar a peces y organismos acuáticos.

-No debe administrarse en perros de raza: Collie, perros ovejeros Shetland, Collies australianos y sus cruces.

INOCUIDAD:

En las dosis recomendadas no existen reacciones adversas aun en hembras gestantes.





INFORMACIÓN TÉCNICA

IVERMECTINA L.A. 1.5%
DECTOFIN PROLONG®



COMPATIBILIDAD:

DECTOFIN PROLONG® puede ser aplicada simultáneamente con vacunas clostridiales y vitaminas.

RECOMENDACIONES:

-Durante la aplicación de productos inyectables se sugieren aplicar preventivamente vacunas anticlostridiales.

-Venta bajo prescripción del Médico Veterinario.

-Conservar en un lugar fresco y protegerse de la luz solar.

- Almacenar entre 5°C a 30°C.

-No aplicar en vacas en periodo de lactación.

PRESENTACIONES:

DECTOFIN PROLONG® se encuentra disponible en las siguientes presentaciones:

Frascos x 10, 20, 50, 100, 250, 500 mL.

REG. SENASA: F.54.01.N.00162

Manténgase fuera del alcance de los niños.



CENTRO DE LLAMADO
REYTA S.A.C.

(051) (01) 440 – 0917

Jr. Tupac Amaru N° 1590- La Perla

Callao- LIMA - PERÚ

Oficina: Jr. Tupac Amaru N° 1590- La Perla
Callao – Lima – Perú
E-mail: ventas@reytaperu.com
www.reytaperu.com
Teléfono: (051) (01) 4400917



*“Comprometidos con
la
salud y la vida”*